

مقدمه: اختلال دو قطبی دوره کودکی و نوجوانی یکی از اختلالات وخیم دوره کودکی و نوجوانی بوده و پیش آگهی و سیر متغیری دارد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت های جنسیتی در سازگاری پیش از بیماری کودکان و نوجوان مبتلا به اختلال دو قطبی انجام گرفت.

روش کار: 52 بیمار 10-18 ساله (25 دختر و 27 پسر) مبتلا به اختلال دو قطبی که در بخش کودکان و نوجوانان بیمارستان روزبه تهران در شش ماهه دوم سال 1390 بستری شده بودند، به شیوه نمونه گیری در دسترس در این پژوهش شرکت کردند. در زمان بستری مقیاس سازگاری پیش از بیماری برای هر بیمار توسط دستیار روانپزشکی بر اساس مصاحبه با والدین و خود بیمار تکمیل شد. تفاوت های دو جنس در خرده

مقیاسها و نمره کلی آزمون سازگاری پیش از بیماری نیز با آزمون تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شد.

نتایج: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که تفاوت آماری معنی داری بین نمرات دو گروه دختر و پسر در سازگاری پیش از بیماری دوره کودکی ( $F=12/53$ ;  $P<0/001$ ) و دوره نوجوانی اولیه ( $F=24/72$ ;

$P<0/001$ )، دوره اواخر نوجوانی ( $F=4/39$ ;  $P<0/04$ ) و نمره کل آزمون ( $F=8/45$ ;  $P<0/005$ ) وجود دارد

ولی در سازگاری کلی پیش از بیماری تفاوت های بین دو جنس یافت نشد.

بحث و نتیجه گیری: این نتایج بیان می کنند که دختران مبتلا به اختلال دو قطبی در دوره های زندگی قبل از

بیماری از سازگاری پیش از بیماری بهتری در مقایسه با پسران برخوردار می باشند.

سازگاری پیش از بیماری، اختلال دو قطبی، کودکان و نوجوانان

Oral